

doravirine 100mg/lamivudine 300mg/ténofovir DF 245 mg

Ce médicament est une combinaison de trois médicaments antirétroviraux regroupés dans un seul comprimé.



À noter : les comprimés contiennent du lactose. Attention en cas d'allergie ou d'intolérance.



Prendre **1 comprimé, une fois par jour**

Poursuivre le traitement les jours suivants en le prenant si possible au même moment dans la journée.



Avaler le comprimé entier à l'aide d'un verre d'eau. Ne pas le croquer, ne pas le casser, ni l'écraser, pour faciliter la prise. Le comprimé peut être pris **avec ou sans nourriture**.



Conserver à l'abri de l'humidité et à température ambiante (moins de 30°C)

En cas d'oubli de prise



- Si le moment habituel de prise **n'est pas dépassé de plus de 12 heures**, prendre la dose oubliée immédiatement. Le lendemain, prendre la dose suivante sans décaler le moment habituel de prise.

- Si le moment habituel de prise **est dépassé de plus de 12 heures**, ne pas prendre la dose oubliée et prendre la dose suivante au moment habituel sans doubler cette dose suivante.

Si les oublis sont fréquents, contacter l'équipe soignante (infirmier.e, médecin, pharmacien).

En cas de vomissement après une prise de médicament



• **moins de 2 heures après** la prise, le traitement n'a pas été absorbé par l'organisme et il doit être repris. Il est possible de le prendre avec de la nourriture.

• **plus de 2 heures après** la prise, le traitement a été absorbé par l'organisme et il est inutile de le reprendre.

Dans les deux cas, prendre la prise suivante au moment habituel sans modifier la dose prescrite. Si les troubles persistent, contacter l'équipe soignante (infirmier.e, médecin, pharmacien).



Ce médicament est en général bien toléré. Cependant, vous pouvez ressentir certains **effets secondaires mineurs durant les premières semaines** suivant l'initiation du traitement. Les plus fréquents sont : fatigue, rash, maux de tête, vertige, nausée, diarrhée, troubles du sommeil, troubles musculaires, perte de cheveux.

La liste complète figure dans la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre médecin référent pour le VIH ou de votre pharmacien.



Ce médicament présente **peu d'interactions médicamenteuses**. Néanmoins, il est important de s'assurer auprès de votre médecin /pharmacien que les médicaments que vous prenez (y compris ceux à base de plantes et ceux pris sans ordonnance) peuvent lui être associés.



Il existe peu ou pas de données sur l'utilisation de la doravirine chez la femme enceinte. Un grand nombre de données chez la femme enceinte n'a mis en évidence aucune toxicité pour la lamivudine ou le ténofovir disoproxil. Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Delstrigo pendant la grossesse..