

ACCIDENTS EXPOSANT AU RISQUE DE TRANSMISSION VIRALE

RECOMMANDATIONS DE SUIVI BIOLOGIQUE

	EXPOSITION SEXUELLE	EXPOSITION AU SANG OU LIQUIDE BIOLOGIQUE	EXPOSITION AU SANG EN PEDIATRIE
J1-4	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH - Sérologie syphilis - Sérologie VHC - Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu) ou Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si non-vacciné) - ALAT - Créatine, test de grossesse (si indication TPE) - PCR chlamydia et gonocoque¹ 		
J1-7		<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH - Sérologie VHC - Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu) ou Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si non-vacciné) - ALAT - Créatine, test de grossesse (si indication TPE) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH - Sérologie VHC - Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu) ou Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si non-vacciné) - ALAT <p>Si TPE instauré :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NFS (si TPE incluant de la zidovudine) - Créatinine - Test de grossesse le cas échéant
S2	<ul style="list-style-type: none"> - ALAT, créatinine (si TPE et comorbidité ou crainte de iatrogénie) 	<ul style="list-style-type: none"> - ALAT - Créatinine (si TPE et comorbidité ou crainte de iatrogénie) 	<ul style="list-style-type: none"> - NFS (si TPE incluant de la zidovudine) - Créatinine (si TPE incluant du ténofovir)
S6	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH (si TPE ou en l'absence de TPE si sujet source de statut VIH inconnu ou VIH+ avec charge virale détectable) - Sérologie syphilis - PCR chlamydia et gonocoque¹ - ALAT et ARN VHC (chez HSH ou si ARN VHC+ chez le sujet source) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH (si TPE ou en l'absence de TPE si sujet source de statut VIH inconnu ou VIH+ avec charge virale détectable) - ALAT et ARN VHC (chez HSH ou si ARN VHC+ chez le sujet source) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH - ALAT et ARN VHC (si ARN HVC+ chez sujet source) - Sérologie syphilis, PCR chlamydia et gonocoque (si exposition sexuelle) - NFS (si TPE incluant de la zidovudine)
S12	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH (si TPE) - Sérologie VHC (chez HSH ou si ARN VHC+ chez le sujet source) - Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si absence d'immunité de la personne exposée et sujet source Ag HBs+ ou de statut inconnu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH (si TPE) - Sérologie VHC (chez HSH ou si ARN VHC+ chez le sujet source) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sérologie VIH (si TPE) - Sérologie VHC - Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si absence d'immunité de la personne exposée et sujet source Ag HBs+ ou de statut inconnu)

Source : Prise en charge des accidents d'exposition sexuelle et au sang (AES) chez l'adulte et l'enfant (septembre 2017)

¹ Indications : femme < 25 ans, homme < 30 ans, ou HSH ou sujet symptomatique / Modalités : 1 à 3 sites de prélèvements selon circonstances